

Консультация для родителей «СВЯЗЬ АНОМАЛИЙ ПРИКУСА И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ»

Подготовила учитель-логопед
Минасян М.В.

Под прикусом понимают положение зубных рядов по отношению друг к другу при полном смыкании верхней и нижней челюстей. Правильным прикусом считается в том случае, если верхние резцы перекрывают нижние на $1/3$, отсутствуют диастемы и тремы (значительные щели между зубами).

Наиболее распространены следующие аномалии прикуса:

■ **Прогнатический прикус (дистальный)** – патология прикуса, при которой верхняя челюсть выдвинута вперед по отношению к нижней (чрезмерно развита верхняя челюсть или недоразвита нижняя челюсть).

■ **Прогенический прикус (мезиальный)** – патология прикуса, при которой нижняя челюсть выступает вперед по отношению к верхней (характерен выступающий вперед подбородок).

■ **Открытый прикус** – патология прикуса, при которой не смыкаются передние резцы (открытый передний прикус) или боковые зубы (открытый боковой прикус), образуя между собой щель.

■ **Глубокий прикус** – патология прикуса, характеризующаяся полным перекрытием верхнего зубного ряда нижних зубов.

■ **Перекрестный прикус** – патология прикуса, при которой нарушено перекрытие между верхними и нижними зубами так, что в некоторые отделы или единичные зубы нижней челюсти закрывают соответствующие верхние.



Патология в строении челюстей и зубов больше всего влияют на произношение свистящих и шипящих звуков, при нормальном артикулировании которых между верхними и нижними резцами должна образовываться очень узкая щель размером не более 1,5 – 2 мм. Наличие прогнатического, прогенического, открытого переднего прикуса лишает ребёнка возможности обеспечить этот момент артикуляции, что и приводит к нарушениям в произношении названных групп звуков. Боковые открытые прикусы способствуют «утечке» воздуха по бокам, что может обусловить «боковое» произношение многих речевых звуков.

Желаем успехов!